par M. Buttet.

[library stamp]

Observations sur l'utilité des injections, pour abreger et du bandage expulsif, rendre plus douce la cure des abscès et autres dépots simples qui se sont ouverts naturellement, et pour suppléer aux incisions considerables.

1ere observ. En 1750, je traitai un panaris de la 3e espece au pouce de la main gauche d'un Cardeur de laine. l'abcès avoit fusé jusqu'à l'articulation de la seconde phalange avec la troisième sur le tendon flechisseur de la premiere. l'ouverture étoit à l'extremité de celle-ci. Comme les accidens étoient passés, je ne crus pas devoir ouvrir la fusée dans tout son trajet: j'aimai mieux faire des injections pendant trois ou quatre jours avec une decoction d'orge dans la quelle je faisois fondre du beaume d'arceus. Je fis ensuite un bandage expulsif, qui en moins de huit jours procura une parfaite reunion. Il est certain que si j'avois fait une incision de deux pouces et demi de long, il auroit fallu plus de 12 jours pour la guérir.

2e observ. Dans la même année, un vitrier eut une inflammation au genouil gauche, la quelle se termina par suppuration. le foyer de l'abcès étoit au moins de l'étendüe de la paulme de la main; c'est à dire, qu'il avoit environ trois pouces de diamettre. Je fus contraint d'en faire l'ouverture à l'endroit le plus éminent, qui étoit le centre de la tumeur. J'y plongeai une lancette, et je fis une simple élevation. Je laissai passer quelques jours sans faire d'injection et je continuai d'y appliquer les maturatifs. Je mis ensuite en usage successivement les injections et le bandage expulsif, et le malade

fut guéri promptement. On sçait assez que le bandage expulsif se fait avec des compresses graduées, ou avec de la charpie brute, &c. et des bandes, et qu'il faut le figurer sur la maladie et sur la partie malade.

3e. observ. La même année un jeune homme reçut un coup de pied de cheval, qui fut suivi d'un abcès, lequel s'ouvrit de luimême. le mal occupoit depuis le mollet de la jambe jusqu'au dessus de la malléole externe, et s'etendoit lateralement environ de trois bons travers de doigt. Il s'etoit ouvert dans sa partie la plus basse par un très petit trou. le bandage expulsif reussit parfaitement en très peu de jours.

4e. observ. Un phlegmon considerable, qui occupoit toute la partie externe du bras gauche d'un pauvre homme, avoit pris la voye de la suppuration. l'inflammation s'etoit communiquée à la partie interne, qui avoit aussi suppuré, desorte que les deux abcès communiquoient superieurement par dessous le tendon interne du muscle biceps. Je fis une incision de deux pouces et demie audessus du condile externe, et une contre ouverture à la partie moyenne interne du bras où se terminoit l'abcès de ce côté là. Lorsque l'abcès eut été mondifié, et que la cicatrice de la playe superieure eut été suffisamment avancée, j'appliquai dessus et dessous le bandage expulsif. je me servis de charpie pour le dessus, et de compresses en dessous. le succès fut prompt et entier.

5.e observ. En 1752 un portefaix, qui avoit depuis longtems une tumeur graisseuse, apeu près du volume de la moitié d'un œuf, située à la partie laterale interne du genouil, fut attaqué d'une inflammation à ce même genouil. la suppuration s'en empara, et s'étendit jusqu'à la loupe. l'abcès perça de lui même son étendüe, qui étoit assez considerable, ne s'opposa point à l'effet des injections et du bandage expulsif. les compresses et la bande étoient percées, pour donner issüe au pus, et pour faciliter le pancement de la petite playe.

6.e observ. Le même portefaix eut ensuite une autre abcès entre les bourses et l'anus, qui s'ouvrit aussi de lui-même. Je le traitai comme le precedent; excepté que je me servis du bandage pour la taille. le succès fut le même.

7.e observ. Une jeune fille avoit au genouil un abcès, qui n'etoit ouvert que d'un petit trou à peine capable de recevoir la pointe de la seringe. les injections et le bandage reussirent parfaitement.

8.e observ. Un jeune homme, à la suite d'un abcès situé en dedans de la main sur la teste de l'os du metacarpe qui soutient le doigt du milieu, en avoit eu trois ou quatre autres qui communiquoient ensemble et avec le premier. Il y avoit plus de 15 jours que sa main étoit en cet état sans apparence de guerison. Je l'injectai quatre ou cinq fois, et il se trouva parfaitement gueri.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

9e observ. • Un homme étoit tombé, la jambe droite entre deux solives; La peau, qui recouvre la partie interne du genouil avoit été soulevée de la largeur de deux pouces et demi. il s'étoit fait un épanchement d'environ une demi palette de sang, qui s'étoit coagulé, et dont la serosité s'étoit separée comme après une saignée. Je donnai un coup de lancette au centre de la tumeur, d'où je fis sortir beaucoup de sérosité sanguinolente et de caillots de sang: c'étoit au moins 15 jours après la chute. Je fis la même manœuvre, que dans l'observation cy dessus, n.º 5. et huit jours après la reunion étoit faite.

10e observ. Un pauvre homme avoit eu un abcès à la partie laterale externe du genouil droit, qui avoit au moins quatre pouces de diamettre, et qui s'étoit ouvert par trois trous, dont deux avoient environ un pouce d'étendüe. en moins de dix jours la peau, qui etoit soulevée et fort émincée, s'est recollée parfaitement, par les moyens dont il s'agit.

Mr. Ledran observations 13. 14. &c parle d'une grande étendüe de peau ainsi soulevée et fort éminceés, que l'on conserva au grand avantage des malades.

Je ne serai pas si temeraire, Monsieur, que de tirer ici aucunes consequences de ces observations. Ce droit est reservé aux maîtres de l'art, dont je ne suis qu'un tres petit avorton. Mais, le cas, que vous en ferez, me decidera sur leur merite. Je pourrois citer un grand nombre d'autres cas, dans lesquels les injections et le bandage expulsif m'ont dispensé de causer de vives douleurs aux malades, et de prolonger leur guérison : au reste, est modus in rebus, sunt certi denique fines, &c.